

הפרד ומשול

פרק 7 ב-Kleinberg/Tardos

קונוולוציה
מרחק עריכה

הקלט: שני פולינומים ממעלה $n-1$

$$p(x) = a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0$$

הפלט: פולינום המכפלה

$$p(x) \cdot q(x) = c_{2n-2} x^{2n-2} + c_{2n-3} x^{2n-3} + \dots + c_0$$

שימו לב:

$$c_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}$$

הווקטור c הוא קונולוציה של a ו- b .

$$c = a * b$$

סימון:

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

6 0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

6 0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

8 6 0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

8 6 0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

6 8 6 0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

6 8 6 0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3

0 2 2

4 6 8 6 0

a = 2 1 3

b = 2 2 0

2 1 3
0 2 2
4 6 8 6 0

במימוש פשוט מספר פעולות החשבון הדרושות:

$O(n^2)$

1. נחשב את ערכי p ו- q ב- $2n$ נקודות $x_0, x_1, \dots, x_{2n-1}$.

2. קל לחשב את ערכי $p \cdot q$ באותן נקודות ע"י $O(n)$ פעולות חשבון:

$$(p \cdot q)(x_i) = p(x_i) \cdot q(x_i)$$

3. עכשיו אפשר לשחזר את $p \cdot q$ - יש לנו $2n$ שורשים של הפולינום

$x - p \cdot q$ שהוא ממעלה $2n-2$.

שאלה: איך מבצעים את צעדים 1 ו-3 ביעילות?

1. נחשב את ערכי p ו- q ב- $2n$ נקודות $x_0, x_1, \dots, x_{2n-1}$.

2. קל לחשב את ערכי $p \cdot q$ באותן נקודות ע"י $O(n)$ פעולות חשבון:
 $(p \cdot q)(x_i) = p(x_i) \cdot q(x_i)$

3. עכשיו אפשר לשחזר את $p \cdot q$ - יש לנו $2n$ שורשים של הפולינום $x - p \cdot q$ שהוא ממעלה $2n-2$.

שאלה: איך מבצעים את צעדים 1 ו-3 ביעילות?

הרעיון הכללי: נבחר קבוצת נקודות מיוחדת, שעבורה קל לחשב את כל הערכים ולשחזר את התוצאה במהירות.


שורשי יחידה מרוכבים

הגדרה: מספר מרוכב ω הוא שורש יחידה מסדר n אם מתקיים $\omega^n = 1$.

יש בדיוק n שורשי יחידה מסדר n . אלו המספרים $e^{2\pi ki/n}$ עבור $k=0,1,2,\dots,n-1$.

שורש היחידה העיקרי מסדר n יסומן ב- $\omega_n = \omega_n^1 = e^{2\pi i/n}$.
כל שורשי היחידה הם $\omega_n^0, \omega_n^1, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{n-1}$.

קבוצת השורשים תחת כפל היא חבורה איזומורפית ל- $(\mathbb{Z}_n, +)$.



תכונות של שורשי היחידה

1. אם n זוגי, אזי $(\omega_n^0)^2, (\omega_n^1)^2, (\omega_n^2)^2, \dots, (\omega_n^{n-1})^2$ הם שורשי היחידה מסדר $n/2$ (יש רק $n/2$ מספרים שונים בסדרה).

2. הווקטורים $v^k = ((\omega_n^k)^0, (\omega_n^k)^1, (\omega_n^k)^2, \dots, (\omega_n^k)^{n-1})$ עבור $k=0, 1, 2, \dots, n-1$ מהווים בסיס אורתוגונלי למרחב הווקטורי \mathbb{C}^n .

התמרת Fourier הדיסקרטית

הגדרה: הצגה של וקטור $a \in \mathbb{C}^n$ בבסיס $v^0, v^1, v^2, \dots, v^{n-1}$ נקראת התמרת Fourier של a .

מקדמי Fourier הם ההטלות של a על אברי הבסיס:

$$Y_k(a) = a \cdot v^k = \sum a_i (\omega_n^k)^i$$

שימו לב: זו בדיוק הצבה של ω_n^k בפולינום

$$Y(a) = a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

חישוב התמרת Fourier הדיסקרטית

הנחה: n הוא חזקה של 2 (אחרת נוסיף אברי 0 ל- a).

$$a^0 = (a_0, a_2, a_4, \dots, a_{n-2})$$

נחלק את a ל-

$$a^1 = (a_1, a_3, a_5, \dots, a_{n-1})$$

$$Y^0(x) = a_{n-2} x^{n/2-1} + a_{n-4} x^{n/2-2} + \dots + a_2 x + a_0$$

נסמן

$$Y^1(x) = a_{n-1} x^{n/2-1} + a_{n-3} x^{n/2-2} + \dots + a_3 x + a_1$$

$$Y(x) = Y^0(x^2) + x Y^1(x^2)$$

אזי

$$Y(\omega_n^0), Y(\omega_n^1), \dots, Y(\omega_n^{n-1})$$

כדי לחשב את

$$Y^0((\omega_n^0)^2), Y^0((\omega_n^1)^2), \dots, Y^0((\omega_n^{n-1})^2)$$

צריך לחשב את

$$Y^1((\omega_n^0)^2), Y^1((\omega_n^1)^2), \dots, Y^1((\omega_n^{n-1})^2)$$

אלו בדיוק מקדמי Fourier של a^0, a^1 (רק $n/2$ ערכים שונים).

FFT(a,n)

if $n = 1$ then return a

$a^0 \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$

$a^1 \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$

$y^0 \leftarrow \text{FFT}(a^0, n/2)$

$y^1 \leftarrow \text{FFT}(a^1, n/2)$

$\omega \leftarrow 1$

for $k \leftarrow 0$ to $n/2 - 1$ do

$y_k \leftarrow y_k^0 + \omega y_k^1$

$y_{k+n/2} \leftarrow y_k^0 - \omega y_k^1$

$\omega \leftarrow \omega \cdot e^{2\pi i/n}$

end for

return y

שימושים נוספים:

- עיבוד אותות
- דחיסה (ADSL, JPEG)
- זיהוי תבניות

נסמן ב- $T(n)$ את זמן הריצה עבור $a \in \mathbb{C}^n$. אזי:

$$T(n) = 2 T(n/2) + O(n).$$

פתרון נוסחת הרקורסיה: $T(n) = O(n \log n)$.

נתונים שני פולינומים q, p ממעלה n עם מקדמים a, b בהתאמה.

נסמן ב- c את מקדמי $p \cdot q$. כלומר, $c = a * b$,

נתייחס לכל סדרות המקדמים a, b, c כאל וקטורים מממד $2n$.

משפט הקונוולוציה: לכל k מתקיים $Y_k(a * b) = Y_k(a) \cdot Y_k(b)$

$$a * b = \text{FFT}^{-1}(\text{FFT}(a) \odot \text{FFT}(b))$$

כפל אבר אבר

$$\begin{pmatrix} Y_0(c) \\ Y_1(c) \\ Y_2(c) \\ \vdots \\ Y_{2n-1}(c) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_{2n} & \omega_{2n}^2 & \cdots & \omega_{2n}^{2n-1} \\ 1 & \omega_{2n}^2 & \omega_{2n}^4 & \cdots & \omega_{2n}^{2(2n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega_{2n}^{2n-1} & \omega_{2n}^{2(2n-1)} & \cdots & \omega_{2n}^{(2n-1)^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{2n-1} \end{pmatrix}$$

↑
FFT(c)

↑
V_{2n}

↑
c

$$c = V_{2n}^{-1} \cdot \text{FFT}(c)$$

$$V_{2n}^{-1}(j,k) = \omega_{2n}^{-jk} / 2n$$

אלו מטריצות Vandermonde

החישוב דומה ל-FFT. הסיבוכיות הכוללת היא $O(n \log n)$.

מרחק עריכה

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C
ϵ							
C							
G							
T							
T							
C							
A							

מרחק עריכה

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C
ϵ	0	1	2	3	4	5	6
C	1						
G	2						
T	3						
T	4						
C	5						
A	6						

מרחק עריכה

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C
ϵ	0	1	2	3	4	5	6
C	1	1	1	2	3	4	5
G	2	1	2	1	2	3	4
T	3	2	2	2	2	2	3
T	4	3	3	3	3	2	3
C	5	4	3	4	4	3	2
A	6	5	4	4	4	4	3

מרחק עריכה

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C
ϵ	0	1	2	3	4	5	6
C	1	1	1	2	3	4	5
G	2	1	2	1	2	3	4
T	3	2	2	2	2	2	3
T	4	3	3	3	3	2	3
C	5	4	3	4	4	3	2
A	6	5	4	4	4	4	3

חיסכון בזיכרון

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C	ϵ
ϵ								
C								
G								
T								
T								
C								
A								
ϵ								

חיסכון בזיכרון

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C	ϵ
ϵ								
C								
G								
T	3	2	2	2	2	2	3	
T								
C								
A								
ϵ								

חיסכון בזיכרון

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C	ϵ
ϵ								
C								
G								
T	3	2	2	2	2	2	3	
T								
C								
A								
ϵ		6	5	4	3	2	1	0

חיסכון בזיכרון

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C	ϵ
ϵ								
C								
G								
T	3	2	2	2	2	2	3	
T								
C								
A		5	4	3	2	2	1	1
ϵ								

חיסכון בזיכרון


$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C	ϵ
ϵ								
C								
G								
T	3	2	2	2	2	2	3	
T								
C		4	3	3	3	2	1	2
A								
ϵ								

חיסכון בזיכרון

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C	ϵ
ϵ								
C								
G								
T	3	2	2	2	2	2	3	
T		4	4	3	2	1	2	3
C								
A								
ϵ								


חיסכון בזיכרון

$y \searrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C	ϵ
ϵ								
C								
G								
T	3	2	2	2	2	2	3	
T		4	4	3	2	1	2	3
C								
A								
ϵ								



חיסכון בזיכרון

$y \downarrow x \rightarrow$	ϵ	G	C	G	A	T	C	ϵ
ϵ								
C								
G								
T	3	2	2	2	2	2	3	
T		4	4	3	2	1	2	3
C								
A								
ϵ								



נסמן ב- $T(m,n)$ את זמן הריצה עבור זוג מחרוזות באורך m ו- n בהתאמה. חישוב שתי השורות האמצעיות עולה $c \cdot mn$, עבור קבוע c כלשהו.

שתי הבעיות המתקבלות הן בגודל $m' \times n/2$ ו- $m-m' \times n/2$.

$$T(m,n) \leq c \cdot mn + T(m',n/2) + T(m-m',n/2) \leq c \cdot mn + c \cdot mn/2 + c \cdot mn/4 + \dots = 2c \cdot mn = O(mn).$$

סיבוכיות המקום: $O(\min\{m,n\})$